

## Простые С-факты

Hepatitis  
Vaccines



Проект Поддержки  
Больных Гепатитом С  
[www.hcvadvocate.org](http://www.hcvadvocate.org)

Версия 1.0 • Апрель 2010

## Вакцины против гепатита

Гепатит С (ВГС или Геп С) повреждает печень, поэтому очень важно, если вы еще не были инфицированы гепатитом А или гепатитом В - защитить себя посредством вакцинации (лекарства, предотвращающее заболевание). Если вы инфицированы одним типом гепатита и заболеваете какой либо другой болезнью печени, например гепатитом другого типа, например гепатитом А или гепатитом В, это может нанести **непоправимый удар** по печени с возможным фатальным исходом.

Вакцину против **гепатита А** вводят в организм в виде инъекции. Вакцинацию проводят дважды, обычно с интервалом от 6 до 12 месяцев (от полугода до года). Вакцина против **гепатита В** вводят в три приема - вторую инъекцию обычно проводят спустя 1 месяц, а третью - спустя 6 месяцев после первой.

Имеется также комбинированная вакцина, ее вводят в три приема. Эта вакцина защищает от гепатитов А и В вместе.

***В настоящее время вакцины против гепатита С (ВГС) не существует***

### Помните...

- Если вы инфицированы гепатитом С, поговорите со своим врачом о том, как защитить себя от других гепатитов.
- Не беспокойтесь, если вы пропустили одну инъекцию вакцины. Главное - сделать все необходимые инъекции, даже если прошло больше времени с момента последней инъекции, чем планировалось.