

Простые С-факты

Ribavirin Warning



Проект Поддержки
Больных Гепатитом С
www.hcvadvocate.org

Версия 1.0 • Апрель 2009

Осторожно, Рибавирин

Рибавирин это таблетка или капсула, которую вы принимаете в комбинации с инъекциями интерферона для лечения гепатита С. Основные побочные эффекты от рибавирина - это кожные раздражения, анемия (снижение количества красных кровяных телец), сухой кашель и токсическое воздействие на плод у беременных. Если у вас есть проблемы с сердцем, рибавирин может их ухудшить, поэтому вы должны предупредить об этом вашего доктора до начала терапии.

Рибавирин может также вызывать кожный зуд и появление кожной сыпи, которые могут быть и результатом какой-то инфекции. Поговорите со своим врачом о помощи при каких другой либо кожных проблемах или раздражениях.

Рибавирин также может оказывать нежелательное влияние на плод у беременной женщины. Поэтому очень важно обсудить с вашим доктором вопрос о противозачаточных таблетках до того как вы начнете терапию. Женщины, проходящие лечение рибавирином, а также женщины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами, лечащимися рибавирином, обязаны проходить регулярный тест на беременность. В принципе, вы и ваш сексуальный партнер должны использовать 2 вида предохранения перед терапией и во время терапии, а также в течение 6 месяцев после ее окончания.

Хорошая новость в том, что можно безопасно беременеть через 6 месяцев после прекращения терапии гепатита С.

Примеры двух форм ограничения рождаемости: для женщин - противозачаточные пилюли, для мужчин – презервативы

Важно помнить:

- Если вы мужчина, принимающий рибавирин, то вы и ваша сексуальная партнерша должны использовать два типа контрацептивов. Ваша партнерша будет приглашена пройти тест на беременность перед началом вашей терапии.
- Если вы женщина, принимающая рибавирин, то вы и ваш сексуальный партнер также должны использовать два вида контрацептивов. Вас попросят пройти тест на беременность до начала терапии.
- Если у вас есть проблемы с сердцем, рибавирин может их усугубить. Известите об этом вашего доктора до начала вашей терапии.
- Если у вас появится кожный зуд либо появится кожная сыпь, поговорите с вашим доктором о возможной помощи.