

## Гепатит С и пирсинг

Гепатит С можно получить во время прокалывания различных частей тела (пирсинге), если при этом не соблюдаются правила безопасности.

Считается, что риск заразиться при пирсинге невелик, однако, если Вы проделали эту процедуру там, где безопасности не уделялось должного внимания, например, в домашних условиях или просто на улице – рекомендуем пройти тест на гепатит С.

**Все иглы должны иметь индивидуальную упаковку, и все пакеты должны вскрываться в Вашем присутствии.**

**Мы рекомендуем производить пирсинг в специализированных салонах, в которых строго соблюдается техника безопасности:**

- Стерилизуются инструменты, которые могут иметь контакт с кровью.
- Используются только одноразовые иглы. Все иглы должны иметь индивидуальную упаковку, и все пакеты должны вскрываться в Вашем присутствии.
- В салоне чисто. Все поверхности дезинфицируются.
- Прокалывание производится в защитных перчатках.
- Все инструменты, которые могут иметь контакт с кровью, выбрасываются в специальные непрокалываемые контейнеры.

### Простые С-факты

*Piercing  
and HCV*



**HCV ADVOCATE**  
[www.hcvadvocate.org](http://www.hcvadvocate.org)

Проект Поддержки  
Больных Гепатитом С  
[www.hcvadvocate.org](http://www.hcvadvocate.org)