

Thuốc-men cho bệnh viêm gan loại C

Bạn và bác-sĩ của bạn quyết-định là sẽ điều-trị bệnh viêm gan loại C của bạn. Điều này có nghĩa là uống 2 loại thuốc. Một loại là thuốc trợ-biến trường-tác kháng-khuẩn đạm-tổ peginterferon. Bạn cần tiêm thuốc này mỗi tuần một lần. Người ta sẽ chỉ-dẫn cho bạn làm điều này. Loại thuốc thứ hai là thuốc viên gọi là khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin. Bạn sẽ có thể uống nhiều viên thuốc này hai lần một ngày.

Trước khi uống những thuốc này, bạn sẽ cần biết những điều sau đây:

- Thuốc trợ-biến trường-tác kháng-khuẩn đạm-tổ peginterferon cần phải được giữ trong nhiệt-độ lạnh. Đừng nên để thuốc quá nóng hay bị đông lạnh. Nếu điều này xảy ra, thì bạn nên gọi cho dược-phòng.
- Bạn nên chứa thuốc ở trong bình chứa nguyên-thủy khi thuốc mới được đem đến.
- Bạn hãy cất tất-cả những thuốc-men và ống chích kỹ-lưỡng tránh xa trẻ-em.
- Bạn hãy uống thuốc khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin cùng với thức-ăn.
- Trước khi bạn bắt đầu, xin bạn kiểm lại ngày hết hạn của thuốc có ghi trên bình chứa thuốc. Đừng dùng thuốc đã quá hạn.
- Mọi người đều có thể quên uống thuốc của họ, nhất là các loại thuốc về bệnh viêm gan loại C. Bạn hãy tìm cách để giúp tự nhắc-nhở cho chính mình. Những bình chứa thuốc cho một tuần và những tấm lịch có thể giúp bạn ghi nhớ được.
- Những loại thuốc này có sanh ra những phản-ứng phụ. Bạn hãy tìm hiểu những phản-ứng phụ là như thế nào, và làm sao có thể ứng-xử đối với chúng. Bạn hãy học biết những phản-ứng phụ nào cần đến sự giúp-đỡ tứcthì.
- Cả bệnh-nhân nam lẫn nữ cần được biết rằng thuốc khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin có thể sanh ra những sự khuyết-tật của thai-nhi. Xin bạn xem tờ thông-tin Những dữ-kiện để hiểu về C: Khuyến-cáo về thuốc khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin.
- Bác-sĩ của bạn sẽ muốn gặp bạn đều-đặn. Bạn cũng sẽ cần có những cuộc thử-máu định-kỳ. Bạn hãy hỏi biết xem khi nào bác-sĩ muốn làm những điều này.
- Bạn sẽ cần vứt bỏ những ống chích đã dùng rồi vào trong một "bình chứa vật nhọn". Bạn có thể đem trả những bình này cho dược-phòng hay vănphòng bác-sĩ.
- Nếu bạn cần đi du-lịch trong lúc đang uống thuốc, thì bạn hãy nói chuyện với dược-sĩ, y-tá, hay bác-sĩ của bạn để làm cách nào có thể làm việc này.

Các nhà chế-tạo thuốc bệnh viêm gan loại C có những y-tá sẵn-sàng trên đường dây "điện-thoại khẩn-cấp" để giúp-đỡ bạn trong những vấn-đề cănbản. Điều này không thay-thế được những sự chăm-sóc y-tế của bạn. Những nguồn giúp-đỡ này rất có ích-lợi.

- Roche-Pegasys: 1.877.734.2797 (1.877.PEGASYS)
- Schering-Peg-Intron 1.888.437.2608 (1.888.HEP.2608)
- Three Rivers Pharma 1.800.405.8506

H

C

V

HCV Medicines



HCV ADVOCATE
www.hcvadvocate.org

DỰ-ÁN HỖ-TRỢ CHO
BỆNH VIÊM GAN LOẠI
C TRANG MẠNG LƯỚI
www.hcvadvocate.org

Ấn-bản 1.2 tháng tu 2009