

Lời khuyên-cáo về thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin

Thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin là những thuốc viên hay thuốc hạt mịn mà bạn dùng chung với thuốc kháng-khuẩn đạm-tổ interferon để điều-trị bệnh viêm gan loại C. Những phản-ứng phụ chính-yếu của thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin là những vết ban, bệnh thiếu hồng-huyết-cầu, ho khan và khuyết-tật khi sanh.

Nếu bạn có bất-kỳ trở-ngại về tim nào thì thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin sẽ làm những trở-ngại này thành tệ hơn, cho nên bạn nên nói cho bác-sĩ của bạn biết trước khi bắt đầu việc điều-trị.

Khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin cũng có thể làm cho bạn bị ngứa, da của bạn bị nổi ban và bạn có thể bị nhiễm-trùng. Bạn hãy nói chuyện với bác-sĩ của bạn để được giúp-đỡ về bất-kỳ trở-ngại nào về da hay về các vết ban.

Khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin có thể gây ra những khuyết-tật khi sanh, cho nên điều thật quan-trọng là bạn nói chuyện với bác-sĩ của bạn về việc hạn-chế sanh-sản trước khi bạn bắt đầu cuộc điều-trị. Người nữ nào đang điều-trị và và những phụ-nữ nào đang là bạn tình của một người nam đang được điều-trị cần phải được thử-nghiệm thai. Thực ra chính bạn và người bạn tình của bạn cần phải dùng hai loại thuốc ngừa thai khác nhau ngay trước thời-gian điều-trị, trong lúc đang điều-trị, và 6 tháng sau khi bạn đã ngưng dùng thuốc điều-trị bệnh HCV.

Tin đáng mừng là nếu bạn đậu thai 6 tháng sau khi đã ngừng dùng thuốc bệnh HCV thì điều ấy không sao cả.

Một thí-dụ về hai loại hạn-chế sinh-sản là một người nữ dùng thuốc ngừa thai, và một người nam dùng bọc che khi giao-hợp

Điều quan-trọng bạn cần nhớ là:

- Nếu bạn là một người nam đang dùng thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin thì bạn và người nữ bạn tình của bạn phải dùng 2 loại thuốc ngừa thai. Người ta sẽ yêu-cầu người nữ bạn tình của bạn là một cuộc thử-nghiệm thai trước khi bạn bắt đầu cuộc điều-trị.
- Nếu bạn là một người nữ đang dùng thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ ribavirin thì bạn và người nam bạn tình của bạn sẽ phải dùng 2 loại thuốc ngừa thai. Người ta sẽ yêu-cầu bạn làm một cuộc thử-nghiệm thai trước khi bạn bắt đầu cuộc điều-trị.
- Nếu bạn có trở-ngại về tim thì thuốc kháng-khuẩn-giảm-sinh trợ-tổ sẽ làm điều này tệ hơn. Bạn hãy thông-báo cho bác-sĩ của bạn trước khi bắt đầu việc điều-trị.
- Nếu bạn có phát ra ngứa, hay bị nổi ban trong khi đang điều-trị thì bạn hãy nói chuyện với bác-sĩ của bạn về các phương-cách giúp bạn kiểm-soát được các vết ban và sự ngứa-ngáy.

H

C

V

**Ribavirin
Warning**



HCV ADVOCATE
www.hcvadvocate.org

**DỰ-ÁN HỖ-TRỢ CHO
BỆNH VIÊM GAN LOẠI
C TRANG MẠNG LƯỚI**
www.hcvadvocate.org

Ấn-bản 1.2 tháng tu 2009