

了解肝脏活组织检查



了解肝脏活组织检查

肝脏活组织检查是一项医疗程序，医生使用一根专门的针从肝脏取出一小片组织检查损害迹象。肝脏活组织检查帮助你 and 医生更多地了解你肝脏的健康状况。

如果你患有丙型肝炎或者其他肝病，并且正在考虑如何进行治疗，这项检查就很重要。在医生未确定你的肝病的原因时，肝脏活组织检查也有帮助。然而，并不是每个人都需要进行肝脏活组织检查。

肝脏活组织检查—程序

肝脏活组织检查是一项在医院进行的医疗程序。在该程序中，你需要仰卧。首先，医生将在你右边的肋骨之间找出最安全做肝脏活组织检查的位置。

然后，医生给该位置的皮肤消毒，并且给你注射(即打针)进行局部麻醉。局部麻醉后，医生插入一根活组织检查针，取出一小片肝组织。该程序的这部分很快完成。

大多数做过肝脏活组织检查的人说有一点点痛。一般是在医生打麻药时有刺痛感。许多人在医生插入活组织检查针时有压力感。有一些人说右肩膀也有这种压力感。

肝脏活组织检查—程序后

做完活组织检查，医生会叫你侧过身子，安静地躺上1或2个小时。这样做是给做活组织检查的地方施加压力，不至于立即起来造成出血或其他问题。过一会儿，医生可能给你验血，确定你没有出血现象。不久以后，你就会被告知可以回家。遵循医嘱，在2个星期内不要提拉重物或者过度锻炼，给自己的身体足够的恢复时间。



HEPATITIS C
SUPPORT PROJECT



了解肝脏活组织

肝脏活组织检查的风险

一般而言，肝脏活组织检查很安全。但是，像任何医疗程序一样，也存在一些风险。这些风险包括：

- 活组织检查处疼痛
- 肝出血
- 如果插入针时出现差错，刺穿其他器官
- 十分罕见的情况下，死亡 (10,000 个案例中1个)

如果你在程序之前的一个星期服用了阿司匹林或其他血液稀释药，则不适合做肝脏活组织检查。做完活组织检查后的一个星期，你也不适合服用这些药物。务必告诉医生你一直在服用或打算服用的所有药物。如果医生认为你的肝脏疾病发展到血液无法正常凝结的程度，你也不适合做肝脏活组织检查。

This HCSP FAQ is also available in the following foreign languages:

- Chinese
- Hmong
- Somali
- Spanish
- Vietnamese

<http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/international.asp>

• Hep C FAQ sheet •

A publication of the Hepatitis C Support Project

Executive Director

Editor-in-Chief, HCSP Publications
Alan Franciscus

Author

Alan Franciscus

Design

Leslie Hoex

Production

C.D. Mazoff, PhD

Contact information:

Hepatitis C Support Project
PO Box 427037
San Francisco, CA 94142-7037
alanfranciscus@hcvadvocate.org

The information in this fact sheet is designed to help you understand and manage HCV and is not intended as medical advice. All persons with HCV should consult a medical practitioner for diagnosis and treatment of HCV.

This information is provided by the Hepatitis C Support Project, a nonprofit organization for HCV education, support and advocacy, and the Minnesota Department of Health.

Reprint permission is granted and encouraged with credit to the Hepatitis C Support Project.

©February 2010 Hepatitis C Support Project



HCV ADVOCATE
www.hcvadvocate.org