

Medicamentos contra el VHC

Usted y su médico han decidido iniciar un tratamiento contra la hepatitis C (VHC o Hep C para abreviar). Eso normalmente requiere tomar 3 fármacos. Uno de ellos es el interferón pegilado. Le enseñarán a ponerse usted mismo las inyecciones de interferón pegilado bajo la piel.

El otro es una pastilla llamada ribavirina. Deberá tomar pastillas de ribavirina dos veces al día junto con alimentos.

Si su médico quiere que tome un tercer fármaco, será un inhibidor de la proteasa. Es muy importante que siga las instrucciones de su médico acerca de cuándo tomarlo; normalmente se toma cada 8 horas, o tres veces al día.

Si su médico quiere que tome un tercer fármaco, será un inhibidor de la proteasa. Es muy importante que siga las instrucciones de su médico acerca de cuándo tomarlo; normalmente se toma cada 8 horas, o tres veces al día.

Recuerde...

- ◆ El interferón pegilado debe mantenerse refrigerado. No debe alcanzar temperaturas muy altas ni congelarse. Si sucede esto, llame a su farmacia.
- ◆ El medicamento debe guardarse en su envase original y mantenerse fuera del alcance de los niños. Eso incluye también las agujas.
- ◆ Antes de comenzar, compruebe la fecha de caducidad en el envase del fármaco. No utilice ningún medicamento caducado.
- ◆ Todo el mundo puede olvidarse de tomar su medicación, especialmente la que trata el VHC. Busque la forma de recordar su siguiente dosis. Los pastilleros semanales y los calendarios pueden ayudarle a mantener un registro de las dosis.
- ◆ Infórmese sobre todos los efectos secundarios de los medicamentos y colabore estrechamente con su médico o enfermera para controlarlos.
- ◆ Los pacientes de ambos sexos deben saber que la ribavirina provoca defectos congénitos en caso de embarazo. Consulte Datos Sencillos sobre la C: Advertencia sobre la Ribavirina.
- ◆ Asegúrese de guardar un registro de todas sus consultas médicas y hágase todos los análisis de laboratorio que le pidan.
- ◆ Utilice un recipiente especial ("sharps") para desechar las agujas usadas, y pregunte a su farmacéutico, médico o enfermera cómo desechar el recipiente de forma segura.
- ◆ Busque los programas de asistencia al paciente disponibles que puedan prestarle apoyo y ayuda mientras sigue el tratamiento.

Datos

C

Sencillos

www.hcvadvocate.org

Lucinda K. Porter, Enfermera titulada

 **HCV ADVOCATE**
www.hcvadvocate.org

07/2011