

# *datos sencillos sobre la* **C**

*Hepatitis C Support Project*  
*www.hcvadvocate.org*

Hay muchas personas que toman metadona y tienen también hepatitis C (VHC para abreviar). En muchos casos se puede llevar una vida normal y saludable con el VHC y tomando metadona. Si tiene hepatitis C, toma metadona y su hígado está dañado es posible que necesite medicamentos para el VHC. Hable con su médico para saber si necesita tratamiento.

Hay dos fármacos para tratar el VHC que se toman juntos. Uno de ellos, el interferón, es un fármaco de debe inyectarse bajo la piel. Existe un tipo nuevo de interferón, llamado interferón pegilado, que se libera lentamente y solamente hace falta inyectarlo una vez a la semana. El otro medicamento que se toma con interferón se llama ribavirina. La ribavirina viene en pastillas o cápsulas y se toma dos veces al día.

Estos medicamentos pueden provocar algunos efectos secundarios. Algunas personas que toman los fármacos para el VHC dicen que se sienten como cuando trataron de dejar las drogas. La buena noticia es que esos efectos secundarios pueden controlarse colaborando estrechamente con el médico o la enfermera. La otra buena noticia es que cerca de la mitad de las personas que toman los medicamentos para el VHC eliminan el virus.

## **Metadona y Tratamiento del VHC**

***La buena noticia es que la mitad de las personas que toman medicamentos para el VHC pueden eliminar el virus.***

### **Es importante recordar que :**



- ◆ Si toma metadona y tiene el VHC debe hablar con un médico o una enfermera para saber cómo mantenerse sano
- ◆ Casi todas las personas con el VHC llevan una vida normal y saludable
- ◆ Se puede recibir tratamiento contra el VHC aunque se tome metadona
- ◆ Hable con su médico para saber si debe tratarse contra el VHC
- ◆ Los efectos secundarios de los medicamentos para el VHC pueden parecer como los efectos que se sienten cuando se están dejando las drogas, pero casi todos esos síntomas pueden tratarse con la ayuda del médico o la enfermera