

# Metadona y Tratamiento contra el VHC

# Datos

# C

# Sencillos

Muchas personas que toman metadona tienen también hepatitis C (VHC o Hep C para abreviar). Si tiene Hep C y toma metadona con el hígado dañado, es posible que necesite tratarse con medicamentos para el VHC. Hable con su médico para

saber si necesita tratarse.

Hay dos fármacos para tratar el VHC que se toman juntos. Uno de ellos es el interferón pegilado; debe inyectarse bajo la piel una vez a la semana. El otro es una pastilla llamada ribavirina que se toma dos veces al día con alimentos.

La medicación puede causar algunos efectos secundarios. Algunas personas dicen que algunos efectos secundarios que les causan los fármacos para el VHC les recuerdan a los que sintieron cuando dejaron de tomar drogas de la calle. La buena noticia es que casi todas estas molestias pueden controlarse colaborando estrechamente con el médico o la enfermera. Otra buena noticia es que la mitad de las personas que siguen una medicación contra el VHC logran erradicar o eliminar el virus.

## ***Recuerde...***

- ◆ Hable con su médico o enfermera para saber cómo mantenerse sano y si necesita tratamiento, y consúlteles el modo de controlar los efectos secundarios.
- ◆ Las personas con VHC que también están tomando metadona pueden recibir tratamiento contra la hepatitis C.
- ◆ Si decide tratarse, conozca los posibles efectos secundarios.

[www.hcvadvocate.org](http://www.hcvadvocate.org)

Alan Franciscus

 **HCV ADVOCATE**  
[www.hcvadvocate.org](http://www.hcvadvocate.org)

Version 2.1, 2010