

Metadona y Tratamiento contra el VHC

Datos

C

Sencillos

Muchas personas que toman metadona tienen también hepatitis C (VHC o Hep C para abreviar). Si tiene hepatitis C puede recibir tratamiento con fármacos contra el VHC. Hable con su médico para saber si necesita tratarse.

Hay 2 o 3 fármacos para tratar el VHC que se toman juntos. Uno de ellos es el interferón pegilado; debe

inyectarse bajo la piel una vez a la semana. El otro es una pastilla llamada ribavirina que se toma dos veces al día con alimentos.

Su médico puede añadir un tercer fármaco (en pastillas), llamado inhibidor de la proteasa, que se toma cada 8 horas, y es muy importante tomar este medicamento cuando su médico le indique que debe hacerlo.

La medicación puede causar efectos secundarios. Algunas personas dicen que algunos efectos secundarios que les causan los fármacos para el VHC les recuerdan a los que sintieron cuando dejaron de tomar drogas de la calle. La buena noticia es que casi todas estas molestias pueden controlarse colaborando estrechamente con el médico o la enfermera. Otra buena noticia es que 7 de cada 10 personas que siguen una medicación contra el VHC pueden curarse.

Recuerde...

- ◆ Hable con su médico o enfermera para saber cómo mantenerse sano y si necesita tratamiento, y consúlteles el modo de controlar los efectos secundarios.
- ◆ Las personas con VHC que también están tomando metadona pueden recibir tratamiento contra la hepatitis C.

www.hcvadvocate.org

Alan Franciscus

 **HCV ADVOCATE**
www.hcvadvocate.org

07/2011