

Perforaciones Corporales y VHC

Datos

C

Sencillos

Existe la posibilidad de infectarse con el virus de la hepatitis C (VHC o Hep C para abreviar) durante un procedimiento de perforación corporal si no se siguen estrictamente las medidas de seguridad adecuadas.

La probabilidad de que esto suceda se considera baja, pero si se ha hecho alguna perforación en un sitio donde no se siguieron las precauciones de seguridad – por ejemplo, si se la hizo un amigo o

una persona en la calle – es buena idea hacerse la prueba del VHC.

Si decide hacerse una perforación corporal, asegúrese de ir a un estudio comercial que preste atención a la seguridad. Allí puede preguntar si le permiten mirar mientras preparan la perforación e incluso mientras realizan una perforación a otra persona, para comprobar que siguen correctamente las medidas de seguridad.

Recomendamos hacerse las perforaciones en salones comerciales que sigan las siguientes medidas de seguridad:

- ◆ Esterilizar todo el equipo que pueda entrar en contacto con sangre.
- ◆ Utilizar exclusivamente agujas nuevas Todas las agujas deben venir envasadas por separado y los envases deben abrirse delante de usted.
- ◆ La sala debe estar limpia y todas las superficies deben estar desinfectadas.
- ◆ Utilizar únicamente guantes de seguridad limpios.
- ◆ Desechar todo el equipo que entre en contacto con sangre; utilizar un recipiente tipo “sharps” para objetos afilados.
- ◆ No se haga ninguna perforación con una pistola perforadora.
- ◆ Visite www.safepiercing.org para consultar más información que le ayude a mantenerse sano.

www.hcvadvocate.org