

Datos

C

Sencillos

¡Advertencia sobre la Ribavirina!

La ribavirina es una pastilla o cápsula que se toma con interferón para tratar la hepatitis C (VHC o Hep C para abreviar). Los principales efectos secundarios de la ribavirina son erupciones cutáneas, anemia (escasez de glóbulos rojos), tos seca y defectos congénitos.

Dado que la ribavirina puede causar anemia, es importante informar al médico si tiene problemas de corazón.

La ribavirina también provoca **defectos congénitos**, por lo que debe asegurarse de utilizar DOS métodos anticonceptivos eficaces antes de comenzar el tratamiento y hasta 6 meses después de finalizarlo. Pregunte a su médico o enfermera qué significan esos dos métodos anticonceptivos. Además, las mujeres deben hacerse una prueba de embarazo antes y durante el tratamiento.

La buena noticia es que es seguro quedarse embarazada 6 meses después de dejar de tomar los medicamentos contra el VHC.

Recuerde...

- ◆ La ribavirina puede causar defectos congénitos en el feto.
- ◆ Si es usted un hombre y está tomando ribavirina, usted y su compañera deben usar dos tipos de métodos anticonceptivos. Su compañera deberá hacerse una prueba de embarazo antes de que usted empiece a tomar el tratamiento y durante el mismo.
- ◆ Si es usted una mujer y está tomando ribavirina, usted y su compañero deben usar dos tipos de métodos anticonceptivos. Usted deberá hacerse una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento y durante el mismo.
- ◆ Si tiene problemas de corazón, la ribavirina puede agravarlos. Informe a su médico antes de iniciar el tratamiento.

www.hcvadvocate.org